

Pépinières *de CONCHY-les-POTS*

PRODUCTEUR DEPUIS 1905



Guide

des variétés fruitières

15 rue de l'Eglise - 60490 CONCHY-LES-POTS
Tél. : 03 44 85 01 21 - Fax : 03 44 85 06 66
contact@pep-puille.fr

Comment nous contacter ?

Vous pouvez :

- appeler au 03 44 85 01 21

MERCI DE PRIVILEGIER VOS APPELS TELEPHONIQUES L'APRES MIDI

- envoyer un mail à contact@pep-puille.fr
- nous rendre visite aux jours et heures d'ouverture.

Horaires d'ouverture

Toute l'année

- Du lundi au vendredi 9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 30 – 18 h 30

D'octobre à mars

- Le samedi 9 h 00 – 12 h 30.

Conditions de paiement

Un acompte sera demandé pour toute commande.

Tous les enlèvements sont payables comptant et sans escompte, soit en espèces, par chèque ou par carte bancaire.

Garantie de Reprise

La reprise des végétaux dépendant :

- Des soins donnés à la réception et à la plantation,
- Des soins post plantation,
- De la nature et de la préparation du sol,
- Des conditions climatiques et autres facteurs qui échappent au contrôle du Pépiniériste, **celui-ci n'en assume jamais le remplacement.**

Tout problème rencontré à la plantation sera examiné et pris en considération.

Châtaigniers (*Castanea*)

Châtaigniers greffés

Doré de Lyon (*rustique, productif, fruits tendres*)

Marigoule (*gros fruits, chair ferme et sucrée*)

Marron de Souillac (*vigoureux et productif, mise à fruits rapide*)

Noyers greffés (*Juglans Régia*)

Franquette (*grosse noix, coque dure*)

Mayette (*coque ovoïde, semi-dure*)

Parisienne (*grosse noix arrondie, coque mi-dure*)

Noisetiers (*Corylus*)

Rondes

Fertile de Coutard

Merveille de Bollwiller

Longues

Coxford

Longue d'Espagne

Nottingham

Pourpres

Rote Zellernuss

Il est préférable de mettre 2 pieds de variétés différentes

Kaki (*Diospyros*)

Fuju (=kaki pomme) (*non astringent*)

Muscat (*maturité novembre - décembre, gros fruit arrondi, chair fondante, sucré, se consomme blet*)

Goji (*Lycium barbarum*)

Fruits dotés de nombreuses vertus médicinales, riche en antioxydants, contient 18 sortes d'acides aminés, 21 oligo-éléments.

Figuers (*Ficus Carica*)

Brown Turkey* **B** (*résistante au froid, doux sucré, juillet à octobre*)

Goutte d'or **B** (*adaptée petits jardins*)

Jannot **B** (*très gros – excellent*)

Madeleine des deux saisons* **B**

Noire de Caromb **B** (*très parfumée*)

Osborn Prolific **B** (*sucré – rustique*)

Rouge de Bordeaux **U** (=Pastillère) (*peu de graines*)

Violette Dauphine **B** (*résistante à l'éclatement*)

Violette Normande **U** (*gros fruits sucrés*)

B bifère 2 récoltes annuelles

U unifère 1 récolte annuelle

**Peut se cultiver en bac moitié terre de jardin moitié terreau*

Kiwi (*Actinidia*)

Pied mâle

Pied femelle Hayward

(Planter un pied mâle pour 2 ou 3 pieds femelles)

Vignes de table (*Vitis*)

Chasselas doré de Fontainebleau

Katharina

Candin

Fanny

Muscat de Hambourg

Casseilles (*Ribes Xculverwellii*)

Anita (*se récolte en plusieurs fois*)

Josta (*auto fertile, juillet*)

Groseilliers à maquereaux (*Ribes uva crispa*)

Captivator

Groseilliers (*Ribes Nigrum*)

Rouges

Jonkheer Van Test (*début juillet*)

Junifer (*début juillet*)

Rovada (*tardive, très productive*)

Blanches

Blanka

Versaillaise blanche

Roses

Roses des sablons

Framboisiers (*Rubus Idaeus*)

Non remontants

Meeker

Remontants

Alpengold (*fruits orangés*)

Héritage

Myrtilles (*Vaccinium corymbosum*)

Blue Crop (*très fructifère, juillet*)

Miss Chery (*septembre à novembre*)

Patriot (*résistante au froid, mi-juillet*)

Spartan (*gros fruit, très sucré, autofertile*)

Il est préférable de planter 2 pieds de variétés différentes, plante de terre de bruyère.

Cassis (*Ribes Nigrum*)

Géant de Boskoop (*début juillet, très parfumé*)

Noir de Bourgogne (*de mi-juillet à fin juillet, très parfumé*)

Abricotiers (*Prunus Arméniaca*)

Précoce de Saumur (mi-juillet)

Brugnons (*Prunus Persica*)

Chair blanche

Morton (mi-juillet)

Chair jaune

Nectared (juillet)

Pêchers (*Prunus persica*)

Chair blanche

Amsden (début juillet)
Chmil
Grosse mignonne (mi-août)
Pêche de Moncheaux^{HDF}
Pêche de vigne
Reine des vergers (début septembre)
Robin

Chair jaune

Dixired (début juillet)
Velvet

Chair rouge

Pêche sanguine (mi-septembre)

Cognassiers (*Cydonia vulgaris*)

Champion (octobre)
Cognassier du Portugal (octobre)
De Vrang (octobre)

Amandiers (*Prunus dulcis*)

Floraison précoce et spectaculaire

Cerisiers (*Prunus cerasus*)

Anglaise Hâtive (mi-juin)
Beauté d'Ohio (juin)
Belle de Meched (début juillet)
Belle Magnifique (juillet)
Bigarreau Burlat (fin mai)
Bigarreau Carré
Bigarreau de Mezele (début juillet)
Bigarreau Géant d'Hedelfingen fin juin – début juillet)
Bigarreau Jaboulay (mi-mai)
Bigarreau Napoléon (mi-juin)
Bigarreau noir d'Ecully^{HDF} (juillet)
Bigarreau stark Hardy Giant (fin juin)
Blanc de Bordeaux (mi-juillet)
Blanc nez^{HDF} (mi-juin)
Cacouane blanche (=Cerise blanche d'Harcigny)^{HDF} (fin juin - juillet)
Cerise blanche de Wavrans sur l'Aa^{HDF} (juillet)
Cerise de Moncheaux^{HDF} (mi-juillet)
Cerise du Sars^{HDF} (mi-juin)
Cœur de Noyon^{HDF} (fin juin)
Cœur de Pigeon^{HDF} (fin juin)
Croquant
Early Rivers (fin mai)
Gascogne tardive de Seninghem^{HDF} (mi-juillet)
Griotte d'Alsace (juillet)
Griotte de Lemé^{HDF} (juillet)
Griotte du Nord^{HDF} (juillet)
Griotte du Vieux Condé^{HDF} (fin juillet)
Griotte précoce de Samer^{HDF} (mi-juillet)
Gros bigarreau de Bouvignies^{HDF} (fin juin)
Gros bigarreau de la Groise^{HDF} (fin juin)
Gros bigarreau d'Eperlecques^{HDF} (fin juin – début juillet)
Gros Coeuret
Grosse cerise Blanche de Verchocq^{HDF} (début juillet)
Guigne noire de Ruesnes^{HDF} (fin juin – début juillet)
Guigne noire du Pévèle^{HDF} (fin juin)
Lappin's (fin juin)
Marmotte (début juillet)
Montmorency courte queue (mi-juin)
Montmorency de Sauvigny (juillet)
Montmorency pleureur (juin)
Petit Bigarreau^{HDF} (juillet)
Reine Hortense (mi-juin)
Reverchon (mi-juin)

Royale (mi-juin – début juillet)
Saint Médard
Summit (mi-juin)
Sunburst (juillet)
Ulster (juillet)
Van (mi-juin)

^{HDF} Variétés des Hauts de France

Néfliers (*Mespillus Germanica*)

Néflier d'Allemagne
(Petit arbre 3 à 5 m)

*Les fruits se récoltent fin octobre avant leur maturité.
Les nèfles sont bonnes quand elles sont blettes*

Nashis (*Pyrus Pyrifolia*)

Appelé pomme - poire

Fruit qui peut être consommé dès la récolte, chair sucrée, acidulée, rafraichissante.

Pruniers

(*Prunus domestica*)

Abricotée jaune^{HDF} (mi- août)
Belle de Louvain^{HDF} (mi-août, auto fertile)

Bleue de Belgique (mi-août)

nécessite un pollinisateur

Coes violette^{HDF} (début septembre)

nécessite un pollinisateur

Conducta^{HDF} (=Reine Claude d'Altan) (août) **nécessite un pollinisateur**

Goutte d'or de Coes^{HDF} (mi-septembre, très sucrée)

Hâtive rouge (mi-juillet)

Madeleine^{HDF} (fin juillet)

Mirabelle de Metz (mi-août)

Mirabelle de Nancy (mi-août) **auto fertile**

Monsieur hâtif^{HDF} (mi-août)

Pluot purple Candy (août)

Président (septembre)

Prune de Montfort (début août)

Prune d'Ente (=prune d'Agen)

Prune Noberte^{HDF} (=prune du Prince) (septembre) **auto fertile**

Prune Pinel

Prune Valor

Quetsche d'Alsace (fin août)
légèrement acidulée

Quetsche d'Italie (septembre)

Reine Claude de Bavay^{HDF} (septembre)

Reine Claude Chambourcy (fin septembre)

Reine Claude Diaphane (août)

Reine Claude dorée^{HDF} (fin août)

nécessite la présence d'un pollinisateur

Reine Claude d'Oullins^{HDF} (août)

Variété pollinisatrice

Reine Claude hâtive^{HDF} (mi-juillet)

Reine Claude Sanguine de

Wismes^{HDF} (mi-juillet)

Reine Claude Verte (fin août)

Reine Claude Victoria (fin août, début septembre) auto fertile

Variété pollinisatrice

Reine Claude violette (fin août)

Sainte Catherine^{HDF} (septembre)

Stanley (début septembre)

Tham's cross (début septembre)

Pommiers à cidre

(*Malus domestica*)

2^{ème} saison (brassage vers le 15

novembre)

Avrolles^{AA}

Barbarie^{DA}

Binet rouge^D

C'huero briz^A

Doux vérêt Cosnard^D

Doux Vérêt de Carrouges^D

Gros bois^{DA}

Groseille^{AA}

Locard vert^{AA}

Longue queue^A

Marie Ménard^A

Mettais^D

Saint Nicolas^A

2^{ème} - 3^{ème} saison (brassage vers le 1^{er}

décembre)

Bouteille de Caen^D

Bonne Chambrière (Mesure)^{DA}

Bramtôt^{DA}

Clos Renaud^D

Dous moën^D

Gris dieppois^{DA}

Gros œillet^D

Judeline^{AA}

Judor^{AA}

Kermerrien^A

Médaille d'or^A

Petit jaune^{AA}

Pomme du verger^A

Quentin^D

Ripeau^{DA}

Roquet long^D

Roquet madame^D

Rouget de Dol^{AA}

3^{ème} saison (brassage mi-décembre)

Amer blanc de Bray^A

Amère de Berthecourt^A

Bedan^D

Doux Normandie^D

Moulin à vent^{DA}

Reine des pommes^A

Rouge de Trèves^{AA}

Rouge duret^D

Rousse de la Sarthe^D

4^{ème} saison (brassage jusqu'à mi-janvier)

Abondance^{AA}

Châtaignier^D

Dabinett^D

Dello^D

Douce Coët Ligné^D

Frequin tardif Mesure^D

Groin d'âne^D

Michelin^D

Peau de vache^D

Treize tonnes^D

Hauchecorne^{DA}

Jeanne Renard^{DA}

Margaux^{DA}

Vice-Président Héron^{DA}

Roquet de Bretagne^A

Tardive Forestier^A

^A Amères

^{AA} Acidulées Aigres

^D Douces

^{DA} Douces Amères

Pommiers à couteau (*Malus*)

A côtes^{HDF} (s)
 Aimée Rabin (s)
 Alkemenne (s)
 Api étoilée (t)
 Api noire (t)
 Api rose (t)
 Argilière^{HDF} (s)
 Arkcharm (s)
 Ascahire^{HDF} (t)
 Baguette d'été (p)
 Baguette d'hiver^{HDF} (t)
 Baguette violette^{HDF} (t)
 Bailleul Bourquin (s)
 Baldwin (t)
 Borowitsky (p)
 Belchard (=Chanteclerc) (t)
 Belle de Boskoop gris (t)
 Belle de Boskoop rouge (t)
 Belle de France (s)
 Belle de Juillet (p)
 Belle de Pissy^{HDF} (t)
 Belle de Pontoise^{HDF} (t)
 Belle et Bonne (s)
 Belle fille de la Manche (s)
 Belle fille de Salins (s)
 Belle fille Normande (s)
 Belle fleur de Thiescourt (s)
 Belle fleur double (s)
 Belle fleur simple (=Petit bon ente)^{HDF} (s)
 Belle rouge (s)
 Bénédictin (t)
 Bénédictin Lème (t)
 Berpui (s)
 Beurrière^{HDF} (t)
 Bondy (t)
 Bouvière^{HDF} (t)
 Bramley Seeding (p)
 Breaburn (t)
 Cabarette^{HDF} (t)
 Calville Alexandre (t)
 Calville Blanc^{HDF} (s)
 Calville des Neiges (t)
 Calville du Roy (t)
 Calville rouge (t)
 Calville rouge d'hiver (t)
 Calville rouge d'Oullins (s)
 Calville rouge du Mont d'Or (p)
 Calville Saint Sauveur^{HDF} (t)
 Chailleux (s)
 Charlotte (p)
 Châtaignier^{HDF} (t)
 Cheron (s)
 Claque pépins (t)
 Cœur de bœuf prime (s)
 Colapuis Catifait^{HDF} (t)

Colapuis Gropui^{HDF} (t)
 Colapuis jaune^{HDF} (s)
 Colapuis Laupui^{HDF} (t)
 Courmont du Nord (t)
 Court pendu d'Espagne^{HDF} (t)
 Court pendu gris (t)
 Court pendu Rouge^{HDF} (t)
 Court pendu Royal (t)
 Cox's orange des Flandres(s)
 Cox's orange Kotegaard (s)
 Cox's orange Pippin (s)
 Cramoisie de Gascogne (s)
 Curé du pays de Bray (=Pays d'Auge)^{HDF} (t)
 Daniel Valiergue (s)
 De l'Estre (=Sainte Germaine) (t)
 De cave^{HDF} (t)
 Deluc (s)
 Double à huile^{HDF} ()
 Double bon pommier rouge^{HDF} (s)
 Elstar (s)
 Falstaff (s)
 Faro (t)
 Faux-Fleuri^{HDF} (tt)
 Fenouillet gris (t)
 Feuille morte (t)
 Fiesta (t)
 Fleuritard (t)
 Fleurs de Juin (t)
 Fraise (p)
 Framboise d'Oberland (=Calville rouge d'Automne) (s)
 Fuji (t)
 Gaillarde^{HDF} (t)
 Galeuse de Bretagne (t)
 Genre Pigeonnet (s)
 Godivet (t)
 Golden (pst)
 Gosselet (=Marie José d'Othée)^{HDF} (s)
 Grand Alexandre (p)
 Grand-mère (s)
 Granny Smith (t)
 Grasveinten (p)
 Green Sleeve (p)
 Gris Baudet^{HDF} ()
 Gris brabant^{HDF} (t)
 Gros bon-ente (s)
 Gros Louis (s)
 Gros suc (s)
 Gueule de Mouton^{HDF} (t)
 Gutt Reinette (t)
 Jacques Lebel^{HDF} (p)
 James Grieve (p)
 Jeanne Hardy (p)
 Jonagold (pst)
 Jonagored (pst)
 Jonathan (s)
 Joseph Musch (s)

Juju (s)
 Jules Labitte^{HDF} (t)
 Jumbo (s)
 Karine Schneider (=Marcel Puille) (s)
 Karmyn (s)
 Katy (p)
 Kidd's Orange Red (s)
 La Paix (s)
 Landouzy (s)
 Lanscailler^{HDF} (t)
 Laxton's Superbe (s)
 Lempennesse (s)
 Luche^{HDF} (s)
 McIntosh (t)
 Maître Pierre (s)
 Marie d'Angleterre (s)
 Marie Doudou^{HDF} (t)
 Marie Madeleine (p)
 Melrose (pst)
 Michel Puille (t)
 Mondial Gala (t)
 Nouvelle France (s)
 Ontario^{HDF} (t)
 Peasgood (p)
 Pépin de Bourgueil (s)
 Pigeonnet blanc d'hiver (t)
 Pigeonnet de Jérusalem (t)
 Pigeonnet de Rouen (t)
 Pigeonnet d'été (p)
 Pigeonnet d'hiver (t)
 Pink gold (pst)
 Plat doux (s)
 Pomme à côtes (p)
 Pomme citron (t)
 Pomme cloche (t)
 Pomme d'anis (t)
 Pomme de champs (=Bielecky) (t)
 Pomme de la Chesnoy (s)
 Pomme de Ons en Bray (t)
 Pomme de Reims (pst)
 Pomme de Revers (s)
 Pomme de Saint Gobain (s)
 Pomme d'éclat (t)
 Pomme des Moissons verte (t)
 Pomme d'orange (s)
 Pomme figue (t)
 Pomme Jérôme (s)
 Pomme Perot (s)
 Précoce de Wirwignes (=Directeur Lesage)^{HDF} (p)
 Quarantaine d'hiver^{HDF} (t)
 Queen Cox (s)
 Querina Florina (s)
 Rambour de Lorraine (t)
 Rambour des Flandres (t)
 Rambour d'été (p)
 Rambour d'hiver (=tardive de Bovignies)^{HDF} (t)

Red Blenheim Passey (s)
 Reine des reinettes (ps)
 Reinette Abry ^{HDF} (s)
 Reinette Ananas (t)
 Reinette Armand Puille (t)
 Reinette Baumann ^{HDF} (t)
 Reinette blanche du Canada (t)
 Reinette bleue d'Auvergne (s)
 Reinette Clochard (t)
 Reinette d'Angleterre ^{HDF} (s)
 Reinette d'Anjou (s)
 Reinette d'Armorique (t)
 Reinette de Breda (s)
 Reinette de Bretagne (t)
 Reinette de Caux (tt)
 Reinette de Cuzy (t)
 Reinette des Flandres ^{HDF} (s)
 Reinette de France ^{HDF} ()
 Reinette de Fugélan ^{HDF} (s)
 Reinette de Hollande ^{HDF} ()
 Reinette de l'Hayette ^{HDF} (t)
 Reinette de Mortemer (t)
 Reinette de Provence (s)
 Reinette de Thiérache (s)
 Reinette de Vigan (s)
 Reinette de Waleffe ^{HDF} (s)
 Reinette des Capucins ^{HDF} (s)
 Reinette des Guiffards (s)
 Reinette Descardre ^{HDF} (t)
 Reinette d'Espagne (t)
 Reinette d'Hustrie (s)
 Reinette Dieppedalle (s)
 Reinette Dorée de la Sarthe (p)
 Reinette Dorée de Versailles (t)
 Reinette d'Orléans (s)
 Reinette Dosnabruck (s)
 Reinette du Chenée (t)
 Reinette du Luxembourg (s)
 Reinette du Mans (t)
 Reinette du Passage (s)
 Reinette étoilée ^{HDF} ()
 Reinette étoilée sanguine (p)
 Reinette Fardel (s)
 Reinette Franche (t)
 Reinette grise de la Sarthe (s)
 Reinette grise de Saintonge (t)
 Reinette grise du Canada (t)
 Reinette grise du grand Faye (t)
 Reinette grise Parmentier (t)
 Reinette Hernaut ^{HDF} (t)
 Reinette Jampi (s)
 Reinette Marcel Puille (s)
 Reinette Rosa (t)
 Reinette rouge de France (s)
 Reinette très tardive (t)
 Richared (t)
 Rose Brow (s)
 Rose de Berne (s)
 Rousseau (s)

Royal d'Angleterre (s)
 Royal François (t)
 Royal gala
 Ruban ^{HDF} (s)
 Rubinette (t)
 Saint Jean (p)
 Saint Médard (t)
 Saint Richaumont rouge (s)
 Saint Richaumont vert (s)
 Saint Vincent (p)
 Sale (t)
 Sang de Bœuf ^{HDF} (s)
 Sans pareille de Peasgood ^{HDF} (s)
 Sans pépins (s)
 Signe Tillisch (p)
 Six côtes (s)
 Starkimson (p)
 Surkoof (t)
 Teint frais (t)
 Tête de chat (=Saint Gobain) ^{HDF} (t)
 Transparente blanche (=Saint Jean) ^{HDF} (p)
 Transparente de Croncels ^{HDF} (p)
 Tydeman's Early (t)
 Valastride (t)
 Verdin d'Automne ^{HDF} (s)
 Verdin d'hiver ^{HDF} (t)
 Vérité (t)
 Vistabella (p)
 Vitoux (s)
 Winter banana (t)
 Wolf rivers (s)

^{HDF} Variétés des Hauts de France

(p) précoce à consommer de juillet à fin septembre
 (s) pomme de saison à consommer d'octobre à décembre
 (t) tardive à consommer à partir de fin mars
 (tt) très tardive à consommer jusqu'en avril
 (pst) se consomme tout au long de l'année.

Pommiers à couteau

Forme colonnaire

(Malus)

Rhapsodie
Rondo

Pommiers à couteau

A chair rouge

(Malus)

Red Devil (p)
 Hidden Rose (s)
 Pekacervenca (s)
 Webster Pinkmeat (s)

Poiriers (*Pirus*)

Abbé Fétel (mi-septembre)
Alexandrine Douillard (fin septembre, octobre)
André Desportes (juillet – août)
Baronne de Mello (octobre - novembre)
Belle Angevine (à cuire) (mars)
Belle de Bruxelles (septembre)
Bellissime d'Hiver (janvier à avril)
Bergamote Esperen (janvier à mars)
Bergamote d'Août (juillet – août)
Bergamote Henrich
Besi de Chaumontel (décembre à février)
Beurré Alexandre (novembre à janvier)
Beurré Apremont (=Beurré Bosc) (octobre - novembre)
Beurré Bachelier (novembre à janvier)
Beurré d'Amanlis (août - septembre)
Beurré d'Anjou (=Nec Plus Meuris)^{HDF} (novembre)
Beurré d'Aremberg (=Orpheline d'Enghein) (novembre à janvier)
Beurré de Mortemer (décembre à mars)
Beurré de Naghin (=Beurré Royal) (janvier à mars)
Beurré Durondeau (=de Tongres) (octobre – novembre)
Beurré Giffard (juin – juillet)
Beurré Hardy (septembre – octobre)
Beurré Lebrun^{HDF} (septembre – octobre)
Beurré Royal (=Beurré Diel) (novembre – décembre)
Beurré Six (novembre)
Beurré Superfin^{HDF} (Septembre à novembre)
Calebasse à la Reine (octobre)
Calebasse d'hiver
Calebasse double
Calebasse Madame Bachelet
Catillac (à cuire) (février – mars)
Charles Ernest (novembre)
Citron des Carmes (octobre)
Clapp's favorite (août)
Comice (novembre)
Comtesse de Paris^{HDF} (décembre – janvier)
Concorde (octobre – novembre)
Conférence (octobre – novembre)
Conseiller à la cour (octobre)
Cornélie^{HDF} (mi-août – septembre)


Côte d'Or^{HDF} (décembre à mars)
Cuisse Madame (=Epargne) (juillet – début août)
Curé (décembre – janvier)
De livre (à cuire) (décembre à mars)
Docteur Jules Guyot (septembre)
Doyenné de Fays
Doyenné d'Alençon (=Doyenné d'Hiver) (janvier à mars)
Duc de Bordeaux (=Epine du Mas) (octobre – novembre)
Duchesse d'Angoulême (octobre – novembre)
Duchesse de Mouchy
Enfant Nantais (octobre)
Eugène Thiriot^{HDF} (octobre - novembre)
Fertilia (octobre – novembre)
Fisée (à cuire)^{HDF}
Fondant du Panisel (=Délice d'Hardenpont) (octobre – novembre)
Fondante du Moulin Lille^{HDF}
Fondante des Bois (septembre)
Fondante Thiriot^{HDF} (octobre – novembre)
Frangipane (novembre – février)
Général Leclerc (octobre- novembre)
Grand Champion (octobre – novembre)
Grosse Louise (septembre)
Highland (octobre – novembre)
Jean Nicolas (à cuire)^{HDF}
Jeanne d'Arc (novembre – décembre)
Joséphine de Malines (janvier à mars)
Jules d'Airolles
Le Lectier (décembre – janvier)
Madame Ballet (janvier - mars)
Madame Grégoire^{HDF}
Marguerite Marillat^{HDF} (août - septembre)
Légipont (= Fondante de Charneu)^{HDF} (octobre – novembre)
Long Chiff (à cuire)^{HDF}
Martin sec (=Rousselet d'hiver) (à cuire) (decembre – janvier)
Madame Lye Baltet
Notre Dame (septembre)
Olivier de Serres (février – avril)
Packam's Triomphe (octobre)
Passe Colmar (décembre à février)
Paul Lequin (à cuire) (janvier à mars)
Pierre Corneille (octobre – novembre)
Pollvine (à cuire)
Poire à côte^{HDF}

Poire à cuire de Wierre-au-bois (à cuire)^{HDF}
Poire à Clément^{HDF}
Poire à Côte d'or (à cuire)^{HDF}
Poire d'Août de Seninghem^{HDF}
Poire de Livre (à cuire)
Poire de Fusée
Poire de Sang (à cuire)
Poire de Seninghem^{HDF} (mi-août)
Poire de Troussencourt
Poire Reinette (à cuire)^{HDF}
Précoce de Trévoux
Premontre
Red Clapp's Favorite (août – septembre)
Red Hardy (septembre)
Rousselet de Reims (septembre – octobre)
Saint Mathieu (à cuire)^{HDF}
Saint Rémy (à cuire)^{HDF} (janvier à mars)
Sainte Germaine d'hiver (janvier à mars)
Sans Pépins^{HDF} (septembre – octobre)
Santa Maria (fin août)
Seigneur Esperen (septembre – octobre)
Soldat Laboureur (octobre – novembre)
Souvenir du Congrès (août – septembre)
Sucrée de Montluçon^{HDF} (octobre – novembre)
Triomphe de Ronchin^{HDF}
Triomphe de Vienne^{HDF} (septembre)
Virginie Baltet (novembre – décembre)
William's bon chrétien (septembre)
William's d'hiver (mi-décembre – janvier)
William's duchesse (octobre – novembre)
William's rouge (octobre)


Formes et distances de plantation

	Haute tige et Demi-tige	Fuseau ou Quenouille	Plamette Oblique	Verrier 4 bras
Abricotier et Pêcher	5 à 6	4	4	
Cerisier	7 à 10	4		
Châtaignier et Noyer	12 15			
Cognassier	5 à 6	4		
Framboisier		0,50		
Groseiller - cassis - caseilles		1,50		
Mûre		1,50		
Néflier	5			
Poirier	6 à 8	3	3	1,20
Prunier	6 à 8	4 à 5		


PALMETTES OBLIQUES 2 étages




PALMETTES VERRIER 4 branches



POMMIERS CORDONS HORIZONTAUX



FUSEAUX 4/5 ANS



Conseils de plantation

Afin d'optimiser la reprise de vos arbres fruitiers, le pépiniériste vous prodigue différents conseils.

- Faire un trou afin de bien aérer la terre
 - Pour les tiges et les demi-tiges 1m20 x 1m20 profondeur 60 cm
 - Pour les fuseaux, les verriers et les cordons 0.80 m x 0.80 m profondeur 60 cm
 - Pour les plantes en container 3 fois la taille du pot en largeur, 2 fois en profondeur.
- N'ajouter ni fumier, ni terreau, ni compost, ni engrais, veillez à ce que la terre soit bien meuble,
- Planter l'arbre sans enterrer la greffe en aménageant une cuvette pour l'arrosage,
- Tuteurer les tiges et ½ tiges :
 - Placer le tuteur,
 - Planter l'arbre à l'est du tuteur,
 - Attacher l'arbre au tuteur avec un collier spécial.

L'arrosage

D'une manière générale, il est nécessaire de pratiquer un arrosage régulier et suffisant :


- Pour la reprise de l'arbre : 20 litres par semaine en période de températures modérées, en cas de sécheresse ou de température élevée il faut adapter la quantité d'eau afin de garder le pied de la plante toujours frais.
- Pour mener les fruits à maturité.

L'entretien

- Pendant toute la vie de l'arbre, il est nécessaire
 - D'ameublir la terre au pied des fruitiers pour permettre aux racines et au sol de respirer (sur environ 1 m de diamètre), pour cela il faut biner le plus souvent possible afin de détruire les mauvaises herbes, ainsi les végétaux profiteront au maximum des arrosages et de la pluie.



Binette :
pour briser la
croûte du sol et
désherber.



Serfouette :
côté plat pour
désherber, côté
fourche pour
ameublir.



Griffe :
pour aérer la
terre et déraciner
les herbes.

- De bêcher le tour de l'arbre courant de l'hiver
 - De ramasser les feuilles et les fruits afin d'éviter la propagation des maladies.
- Il est impératif de surveiller et d'éliminer les pucerons sur les arbres fruitiers. Vous pouvez utiliser un insecticide adapté ou une décoction de feuilles de rhubarbe (1.5 kg de feuilles de rhubarbe pour 10 litres d'eau laisser macérer 72 heures, filtrer puis pulvériser) ou un purin d'orties (1 kg d'orties pour 20 litres d'eau, laisser macérer 2 semaines, filtrer puis pulvériser).
 - Afin de lutter contre les maladies cryptogamiques telles que, les morilles, l'oïdium (apparition sur le dessus des feuilles d'un feutrage blanc qui s'étend ensuite sur tout la feuille qui va se déformer et sécher), le botrytis (pourriture grise), la cloque du pêcher (déformation des feuilles, générant de grosses cloques qui virent souvent au rouge), l'antracnose (maladie du charbon) ou la moniliose des fruits (pourriture brune sur les fruits), vous pouvez procéder à un traitement à la décoction de prêle (1 kg de tiges de prêle finement coupées bouillies dans 10 litres d'eau pendant 30 mn, macération 24 h puis pulvériser après dilution à 20 %).
 - Afin de lutter contre les insectes vous pouvez installer des rangées de plantes au parfum aromatique :
 - Thym,
 - Romarin,
 - Lavande.

Les maladies

Oïdium (ou blanc) : feutrage blanc sur les feuilles qui se dessèchent et tombent

Pourriture grise (Botrytis) : Duvet grisâtre sur fleurs, fruits et feuilles. Eviter une trop forte humidité.

Rouille : petites taches brun rougeâtre ou orange à la face inférieure des feuilles.

Les parasites

Pucerons : il existe de très nombreuses espèces de pucerons. Ils piquent les feuilles qui s'enroulent et se décolorent.

Thrips : petits insectes qui piquent les feuilles et sucent la sève. Apparition de petites tâches blanches sur la face supérieure.

Ver blanc : Collets et racines sont attachés, présence dans le sol d'un gros vers blanc.

Chenilles : Les feuilles sont dévorées et perforées. Présence de déjections.

Aleurade (mouche blanche) : pique les feuilles et entraîne le développement de fumagine (dépôt noir sur les feuilles).

Vos notes

Pépinières de CONCHY-les-POTS

PRODUCTEUR DEPUIS 1905

15 rue de l'Eglise - 60490 CONCHY-LES-POTS
Tél. : 03 44 85 01 21 - Fax : 03 44 85 06 66
contact@pep-puille.fr

Merci de privilégier vos appels téléphoniques l'après-midi